



Tara înregistrării **Franța**
 Data înregistrării **2005**
 Precocitate **500**
 Destinație **Boabe**

ARZANO



Tip bob **Sticlos**

PRECOCITATE

Înflorire	Maturitate bob (32% H2O)	Maturitate siloz 30% SU
Necesar de $\sum TBA$ (baza 6°C) = 1015	Necesar de $\sum TBA$ (baza 6°C) = 1950	Necesar de $\sum TBA$ (baza 6°C) = /
<small>$\sum TBA$: Suma de temperaturi biologice active</small>		<small>SU: Substanță uscată</small>

CARACTERISTICI

Morfologia plantei	Știulete	Elemente de productivitate
Aspect plantă 7	Știulete Lung și subțire	Număr boabe /rând 40-45
Talie Medie	Bob Sticlos	Număr rânduri 14-16
Înălțimea de inserție a știuletelui medie spre înalt	Culoarea bobului Portocaliu	MMB 290-300
Vigoare la răsărire 8	Fecundare:	
Aspect frunze 1/2 Erecta	Regularitate 8	
	Fecundarea până în vârful știulete 7	

Notație: 1 la 9; 9= foarte bun

REZISTENȚA LA BOLI

Plantă	Știulete
Cădere în vegetație 8	Ustilago maydis: 8
Frângere la recoltare 8	Fusarium: 8
Helminthosporium turcicum: 7	Graminearum: 8
Tulpini goale: 7	Liseola: 8
Stay green: 7	
Ustilago maydis 8	

Legendă : **8** Tolerantă **7** Destul de sensibilă **6** Sensibilă

SPECIFICITATEA

Valoare nutriție	Valoare tehnologică
Nutritiv (UFL ¹) /	Semolina (RBS) 71
Digestibilitatea (DINAG ²) /	Semolina (RBH) 60
Amidon /	Waxy /
	Ethanol Potențial /
	Biogaz /

Legendă : **8** Mare **7** Medie **6** Mică (1) Unități furajere lapte (2) Digestibilitate de tulpini și frunze

DENSITATEA

	Condiții optime	Condiții dificile
Potențial boabe	8	8
Densitatea recomandată la recoltare (pl/ha)	70.000	60 000
Potențial siloz	/	/
Densitatea recomandată la recoltare (pl/ha)	/	/

>>> Medie pe piață
 > Medie pe piață
 = Medie pe piață
 < Medie pe piață

(*) Sursa: Data Dezvoltare MAÏSADOUR semences

DESCRIERE HIBRID / RECOMANDĂRI

Utilizabil în industria de morărit